

Estimari privind evolutia conditiilor agrometeorologice in intervalul 17 Februarie - 02 Martie 2010



Descriere imagine:
Peisaj de iarna

Regimul termic al aerului va fi per ansamblu normal pentru aceasta perioada în majoritatea zonelor agricole si usor mai ridicat în estul si sud-estul tarii. În intervalele calde temperaturile maxime ale aerului pot atinge si chiar depasi 10oC, îndeosebi zonele de câmpie din sudul si vestul tarii, iar în zilele cele mai reci, este posibil sa se înregistreze temperaturi minime sub -10...-5oC, în special în zonele de depresionare din centrul si nordul teritoriului.

Se întrevade un regim pluviometric în general normal, în aproape toate zonele de cultura ale tarii. Precipitatiile vor fi sub forma de ploi, dar si mixte (ploaie, lapovita si ninsoare), însoțite local de intensificari temporare ale vântului.

Starea solului

Rezerva de umiditate accesibila plantelor de grâu de toamna, pe profilul de sol 0-100 cm, se va situa la valori optime, apropiate de optim si satisfacatoare la nivelul întregii tari.

Starea de vegetatie a culturilor agricole

Culturile de câmp si speciile pomi-viticole se vor afla predominant în stadiul de repaus biologic în cea mai

mare parte a regiunilor agricole, exceptând intervalele calde, când vor fi posibile reluări lente ale proceselor de creștere și dezvoltare, îndeosebi pe arealele agricole din sudul țării. În zilele cele mai reci, cu temperaturi minime situate sub pragul biologic critic de rezistență a plantelor (-10°C) vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar (brunificare, arsuri etc.), îndeosebi la culturile cerealiere de toamnă și emanate în afara epocii optime, nepregătite pentru rezistența la condițiile de iernare și fără strat protector de zăpadă.

La culturile de orz și grâu de toamnă însemănțate în perioada optimă, se vor înregistra fazele de formare a frunzei a 3-a și înfrățire, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind pe ansamblu bună și medie. Sămanăturile întârziate fenologic vor parcurge răsărirea, apariția frunzei a 3-a și înfrățirea, plantele prezentând o vigurozitate slabă și densitate redusă.

Răpita va parcurge înfrunzirea, iar starea de vegetație se va menține în general bună și medie.

Pomi fructiferi și vița de vie se vor afla predominant în repaus vegetativ în majoritatea plantațiilor, iar la speciile timpurii de sămburoase (cires și visin), în zilele cele mai calde, vor fi posibile ritmuri lente în desfășurarea fenofazei de înmugurire, în special pe terenurile cu expoziție sudică.

Recomandări de specialitate/calendărul lucrărilor agricole

- Efectuarea arăturilor pe suprafețele fără strat de zăpadă;
- Continuarea lucrărilor de arat și tăieri în plantațiile viti-pomicole;
- Administrarea îngrășămintelor cu azot la culturile cerealiere de toamnă și organice la pomii fructiferi și vița de vie;
- Continuarea efectuării controlului biologic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă și a mugurilor de rod la speciile pomi-viticole.