

Cum sa hranim corect broilerii de curca



Descriere imagine:
Pasarile beau apa

În perioada sarbatorilor si ma refer îndeosebi la Anul Nou, am stat de vorba cu mai multe persoane care spuneau ca vor gati carne de curcan pentru ca asa este traditia.

Asa este traditia era unul din motive iar altul faptul ca este o carne dietetica si foarte gustoasa cunoscut fiind faptul ca în curcan sunt sapte feluri de carne. Caracteristic carni de curca este continutul scazut în grasime, comparativ cu carnea altor pasari, în carcasa proportia de piept este ridicata, ceea ce mareste valoarea comerciala a carni de curca.

De asemenea, discutiile le-am avut cu persoane care locuiau la casa si care îsi propuneau ca din primavara sa înceapa sa creasca pui de curca atât pentru familiile lor cât si pentru vânzare.

Pe piata româneasca au aparut rase de curcani de tip greu caracterizate printr-o crestere rapida si o greutate mare la sacrificare. Cei care doresc, pot sa-si cumpere broileri de curca, dar îi sfatuim sa aiba grija cum îi furajeaza pentru ca sunt sensibili si necesita o furajare corespunzatoare vârstei pentru a-si exterioriza potentialul lor productiv si ma refer la sporul în greutate.

Astfel în cresterea broilerilor de curca se parcurg mai multe perioade si anume:

Perioada întâi - de la ecloziune la 4 saptamâni

În aceasta perioada este nevoie de un furaj care sa asigure 2800 kcal energie metabolizabila, 28% PB 1,6% lizina, 0,55% metionina, 1,2% Ca, 0,7% P. Un astfel de furaj se obtine din urmatoarele

componente: porumb 34%, orz 10%, srot de soia 41%, srot de floarea soarelui 7%, faina de peste 5%, sare 0,2%, carbonat de calciu 1%, fosfat monosodic 0,8%, premix vitamino-mineral 1%.

Perioada a doua - de la 4 la 8 saptamâni

Broilerii de curca trebuie furajati cu un nutret combinat având urmatoarele caracteristici: 2900 kcal energie metabolizabila, 26% proteina bruta, 1,5% lizina, 0,45% metionina, 1% Ca, 0,6% P.

Un astfel de furaj se poate obtine din urmatoarele componente: porumb 40%, orz 10%, 35% srot de soia, 7% srot de floarea soarelui, 5% faina de peste, sare 0,2%, carbonat de calciu 1%, fosfat monosodic 0,8%, premix vitamino-mineral 1%.

Perioada a treia - de la 8 la 12 saptamâni

În aceasta perioada, puii de curca se hranesc cu un furaj combinat având urmatoarele caracteristici: 3000 kcal energie metabolizabila, 22% proteina bruta, 1,3% lizina, 0,40% metionina, 0,85% Ca, 0,42% P.

Un astfel de furaj se poate obtine din urmatoarele componente: porumb 51%, orz 10%, 24% srot de soia, 7% srot de floarea soarelui, 5% faina de peste, sare 0,2%, carbonat de calciu 1%, fosfat monosodic 0,8%, premix vitamino-mineral 1%.

Perioada a patra - de la 12 la 16 saptamâni

Broilerii trebuie sa se furajeze cu un furaj combinat având urmatoarele caracteristici: 3100 kcal energie metabolizabila, 19% proteina bruta, 1% lizina, 0,35% metionina, 0,75% Ca, 0,38 % P.

Un astfel de furaj se poate obtine din urmatoarele componente: porumb 57%, orz 10%, 20% srot de soia, 7% srot de floarea soarelui, 2% faina de peste, grasime 1% sare 0,2%, carbonat de calciu 1%, fosfat monosodic 0,8%, premix vitamino-mineral 1%.

În cazul prelungirii perioadei de crestere peste 16 saptamâni furajul care se administreaza trebuie sa asigure 3200 kcal energie metabolizabila, 16,5% PB, 0,8% lizina, 0,25% metionina, 0,65% Ca si 0,32% P disponibil.

Acest furaj combinat se obtine din urmatoarele componente si în urmatoarele proportii de participare: porumb 62,5%, orz 10%, srot de soia 13%, srot de floarea soarelui 7%, faina de peste 2%, grasime 2,5%, sare 0,2%, carbonat de calciu 15, fosfat monosodic 0,8%, premix vitamino-mineral 1%.

Daca doriti sa cresteti puii de curca pâna la 24 de saptamâni trebuie sa stiti ca ei pot atinge greutatea de peste 20 kg masculii si 14 kg femelele.

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(33)/2005

Lavinia STEF