

Intretinerea rasadului dupa repicat



Descriere imagine:
Rasaduri de rosii

Înainte de a repica tinerele plante, cuburile umplute cu pamânt si cu turba se stropesc cu o solutie care va contine insecticid si acaricid.

Solutii aplicate înainte de repicare: **Actara** sau **Mospilan** 5 g în 10 l apa + **Nisorun** sau **Sannite10** g în 10 l apa + **Previcur energi** 15 ml în 10 l apa. Cu toate aceste solutii, puse în 10 litri de apa, se stropeste su praful de cuburi, dupa care se repica plantele.

Dupa ce s-au repicat, tinerele plante se uda cu apa calduta.

Important este ca primul tratament sa se faca la radacina plantei cu Tachigarem 0,1 (100 ml) la 100 l apa sau Previcur energi 100 ml sau Previcur 607 LSL 150-200 ml la 100 l apa.

Dupa ce ati repicat, fiti atenti la temperatura, lumina si la umiditatea rasadului.

În primele cinci zile de la repicare, la ardei si la tomate, temperatura trebuie sa fie de 18-20°C, dupa care se va coborî cu 2-3 grade.

În zilele însorite, când temperatura depaseste 25°C, se aeriseste, dar foarte putin, pentru a schimba atmosfera.

Nu udati în exces cuburile, mai bine o faceti mai des cu apa mai putina.

În cele 40-45 de zile pâna la transplantarea rasadului este indicat sa aplicati trei tratamente cuburilor:

- imediat dupa repicare: Tachigarem 0,1;
- la 10-15 zile de la repicare: Previcur energi 0,1;
- înainte de transplantare, cu Topsin (0,05) + Folpan (0,15).

Tratamente foliare fitosanitare

- ? dupa 7-10 zile de la repicat: Previcur energi 0,1 + Mospilan 3 g la 10 l apa + Nisorun 5 g;
- ? dupa 10 zile de la primul tratament Ditrane 20 g + Actara 4 g + Sanmite 10 g la 10 l apa;
- ? dupa 10-12 zile: Bravo sau Rover 0,20 + Topsin 0,1 + Confidor energi 0,1 sau Vertimek 0,1 sau Milbeknol 0,1.

Ferma