

Lucrari de primavara in plantatiile de capsuni



Descriere imagine:
Camp cu capsuni

În acest articol va prezentăm principalele lucrări de primăvară pe care trebuie să le faceți în plantațiile de capsuni și luăm pe rând culturile vechi, plantațiile tinere, apoi pe cele noi.

? **În plantațiile vechi**, imediat după uscarea terenului, suprafața se curăță de frunzele uscate, care se greblează, se scot din plantație, dacă este cu puțință, și se ard. De multe ori, această verigă tehnologică este sarită, dar nu trebuie uitat faptul că frunzele uscate sunt purtătoare de boli. Sporii de pe aceste frunze vor germina în curând și vor fi o sursă importantă de infecție pentru plantele sanatoase. Apoi, se face prima prasila mecanică între rândurile de capsuni, precum și cea manuală pe rând.

Împotriva buruienilor din samânta se poate face o erbicidare cu **Venzar** și **Dual Gold** pe toată suprafața. Se aplică primul tratament împotriva principalelor patări ale capsunului. Recomandăm efectuarea unei stropiri cu un produs cupric sau chiar cu zeama bordeleza. Produsele cuprice au spectru larg de acțiune, nu sunt toxice, fiind acceptate chiar și pentru culturile biologice.

În cazul în care există o presiune mare a patarilor, al doilea tratament se face la 10-14 zile cu **Dithane M-45** sau cu alt produs pe bază de **mancozeb 0,2%** și eventual cu **Topsin 0,1%** sau cu **Sumilex**. Trebuie să avem la îndemână și un produs care să controleze putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*), care se aplică imediat după înflorit.

Să nu uităm umiditatea. Chiar dacă am avut o iarnă și o primăvară bogate în precipitații, în cazul în care nu plouă timp de opt-zece zile, vom iriga.

Dacă fertilizarea nu s-a efectuat și în ?mustul zapezii?, este posibil să fi pierdut o parte din producție. Asada

r, trebuie sa ne grabim, având în vedere ca dupa înflorire plantele nu mai folosesc eficient îngrasamintele. Cele cu azot nu se aplica în exces, fiindca dauneaza calitatii productiei. Folositi îngrasaminte complexe, preferabil îmbogățite cu Mg, Zn si B. Carenta în magneziu si zinc este vizibila în multe dintre plantatiile de capsuni din România.

? **În plantatiile tinere**, putem spune ca plantele de capsuni au iernat foarte bine. Avem putine semnale despre pierderi înregistrate din cauza înghetului. Daca s-a plantat la timp, pâna la 15 octombrie, plantele s-au înradacinat foarte bine si se prezinta corespunzator în aceasta primavara.

De suferit au avut plantatiile înfiintate târziu, chiar si în luna noiembrie. Aici a aparut fenomenul de ?de scaltare?, adica plantele au fost scoase din pamânt prin fenomenele de înghet-dezghet repetate. Aici, plantele trebuie puse urgent din nou în contact cu solul pâna nu se deshidrateaza. În rest, se executa lucrarile recomandate pentru culturile vechi.

Atentie se acorda buruienilor, care în primul an concureaza foarte usor plantele.

Si aparitia stolonilor creeaza probleme în majoritatea plantatiilor de capsun.**Daca nu eliminam stolonii, planta mama se epuizeaza repede, si riscam ca anul viitor sa obtinem ?iarba de capsuni? si nu productie.**

Daca lasam plantele sa se îndeseasca, crezând ca un numar mare de plante ne va aduce o productie mare, facem cea mai mare greseala, deoarece plantele se concureaza între ele, lucrarile nu se mai pot executa, nu se poate afâna solul, iar rezultatul este o productie mica si de slaba calitate.

Daca distanta între rânduri este corespunzatoare, se lasa maxim 1-2 plante pe rând, iar restul se elimina.

ÎNFIINTAREA CULTURILOR

Pentru plantatiile noi se folosesc plante sanatoase, din pepiniere autorizate, iar plantarile se fac pâna la sfârșitul lunii aprilie. Terenul trebuie sa fie bine pregatit. Imediat dupa plantare, capsunii se uda daca nu ploaie în una sau cel mult doua zile. Nu mizati pe umiditatea din sol, deoarece aceasta nu asigura o productie satisfacatoare.

Daca ati plantat în primavara, eliminati florile care apar imediat dupa plantare, deoarece epuizeaza planta si veti avea probleme atât la prindere, cât si la dezvoltarea ulterioara a plantelor.

Daca furnizorul n-a facut primul tratament la radacina si la planta înainte de ambalare, trebuie sa-l faceti la circa 2-3 saptamâni de la plantare, pentru a proteja cultura împotriva principalelor boli.

Plantele luate dintre rânduri, din plantatiile vechi, va creeaza numeroase probleme deosebite în ceea ce priveste controlul bolilor si daunatorilor.

Când cumparati plante, nu va lasati amagiti de sintagme de tipul ?capsuni urcatori? sau ?capsuni uriasi?, menite sa va pacaleasca.