

## Structura de plante furajere ce se poate semana în aceasta primavara



Descriere imagine:  
Ghizdeiul

**Pentru crescatorul de animale si producatorul de furaje, primavara este perioada în care se e xecuta cele mai multe lucrari agricole necesare înfiintarii culturilor furajere anuale si perene.**

Fata de alte culturi agricole, plantele furajere, prin natura lor biologica si a modului de furajare, au cerinte tehnologice diferite care, cunoscute si aplicate în conditii optime, garanteaza reusita (productia - c antitativ si calitativ).

În general, în tehnologia de cultivare a plantelor furajere se recomanda respectarea urmatoarelor verigi de baza: ? calitatea semintelor ? perioada de semanat ? norma de semanat.

Respectarea perioadelor de semanat si a normelor sau cantitatilor de seminte, asigura o rasarire buna a plantelor si o densitate optima a acestora (vezi tabel).

**Structura culturilor furajere de primavara pentru diferite zone agricole din România**

| Specia  | Perioada de semănat   | Norma de semănat (kg/ha)   |
|---|---|--|
| Lucernă (cultură pură)  | 1-20 martie   | 22-24 kg/ha  |
| Trifoiul roșu (cultură pură)  | 1-20 martie   | 18-20 kg/ha  |
| Chizdeiul (cultură pură)  | 1-20 martie   | 16-18 kg/ha  |
| Sparceța (cultură pură)   | 1-20 martie   | 70-80 kg/ha  |
| Paiște semănată (toate tipurile de amestecuri)  | 10-30 martie  | 40-45 kg/ha (sămânță amestec în funcție de procentul de participare a fiecărei specii)   |
| Ovăzul (cultură pură)   | 1-20 martie   | 140-160 kg/ha  |
| Borșeașul de primăvară  | 1-20 martie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 kg/ha mazăre + 50 kg/ha ovăz</li> <li>▪ 100 kg/ha mazărice + 50 kg/ha ovăz</li> </ul>       |
| Sfieclă furajeră  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10-30 martie în zonele de câmpie</li> <li>▪ 1-10 aprilie în zonele de deal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5-7 kg/ha, soiuri monogeme</li> <li>▪ 8-10 kg/ha, soiuri plurigeme</li> </ul>                   |
| Rapița furajeră   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10-30 martie sau la intervale de 10 zile pentru eşalonarea producției</li> <li>▪ în cultură dublă după cereale de toamnă (orz, grâu, secară), până cel târziu în 20 iulie</li> </ul> | 10-12 kg/ha  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porumbul boabe</li> <li>▪ Porumbul pentru siloz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10-20 aprilie în zonele de câmpie</li> <li>▪ 20-30 aprilie în zonele de deal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12-15 kg/ha, la porumbul boabe</li> <li>▪ 20-25 kg/ha, la porumbul pentru siloz</li> </ul>      |
| Porumbul pentru masă verde (cultură pură sau în amestec)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semănat după culturi premergătoare timpurii (borșeașul de toamnă, rapița de toamnă, orz, secară, grâu)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80-100 kg/ha, în cultură pură</li> <li>▪ 40 kg/ha porumb - 60 kg/ha soia, în amestec</li> </ul> |
| Meiul   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semănat după culturi premergătoare timpurii ca și în cazul porumbului pentru masă verde</li> </ul>   | 25-30 kg/ha  |
| Sorgul  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 25 aprilie - 10 mai</li> </ul>   | 25-30 kg/ha  |
| Iarba de Sudan și hibridul sorg x iarbă de Sudan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 25 aprilie - 10 mai</li> </ul>   | 25-30 kg/ha  |

Articol publicat în revista *Ferma nr. 1(33)/2005*

Nicolae Dragomir