

## Strutul, un "bataus" nocturn



Descriere imagine:  
Strutul- Struthio camelus

**Strutul, originar din Africa, s-a raspândit si este crescut pe arii geografice întinse. Acest fapt se datoreaza capacitatii mari de a se adapta si a sistemului imunitar care-l protejeaza la agresiunea microbiana.**

În mediul lor natural, strutii traiesc în comunitati constituite în grupuri de pasari de vârsta si sexe diferite, în care exista o ierarhie bine stabilita, conducatorul grupului fiind de obicei un mascul adult. Aceste comunitati se destrama în timpul sezonului de împerechere, când are loc formarea perechilor.

Fiind pasari care parcurg o distanta mare în cautarea hranei, atunci când sunt tinute în captivitate trebuie asigurat un spatiu suficient de mare, pentru ca altfel apare plictiseala, si încep sa se ciupeasca între ele. În captivitate, strutii se obisnuiesc foarte repede cu mediul înconjurator, fiind prieteni cu oamenii, apropiindu-se de acestia, chiar ciugulindu-le hainele sau mâinile. Sunt pasari foarte curioase si sunt atrase de obiectele stralucitoare pe care, daca au acces la ele, le si înghit.

Sezonul de reproductie este influentat de zona geografica si implicit de durata zilei lumina. Pentru tara noastra, sezonul de reproductie corespunde cu începutul primaverii. În aceasta perioada femelele efectueaza un dans prenuptial, la masculi culoarea pielii de pe picioare, de pe gât si cioc devine rosie, iar pentru a-si arata dominanta, acesta își ridica coada si își etaleaza penisul.

Intensitatea si manifestarea ritualului de împerechere scade pe masura ce femela se apropie de sfârșitul sezonului de ouat. În salbaticie, într-un cuib se gasesc oua ce provin de la mai multe femele, cele din mijloc fiind cele ale femelei dominante.

Din punct de vedere al alimentatiei, strutul, spre deosebire de marea majoritate a pasarilor domestice, este erbivor si nu granivor, iar aparatul digestiv seamana mai mult cu cel al iepurelui sau al calului.

Se hraneste cu o gama larga de plante, dar în mediul lor natural consuma des insecte si reptile de dimensiuni mici. Un adult consuma zilnic 4-6 kg de plante verzi, iar în captivitate toate nutreturile trebuie tocate la maxim 3-4 cm. Pentru triturarea hranei, strutul consuma o cantitate semnificativa de nisip si pietris.

Comportamentul de lupta la strut se manifesta prin ciupire, zgâriat, lovire cu picioarele si aripile, iar majoritatea luptelor se desfasoara spre seara.

*Articol publicat în revista Ferma nr. 1(39)/2006*

*Ferma*